

## 【 悪性黒色腫 】

2021.06現在

レジメン名	投与量	剤型	投与時間	投与日	投与間隔
DAV療法	ダカルバジン (100mg/m <sup>2</sup> )	注射	30分	Day1-5	6週間間隔
	ニムスチン (60mg/m <sup>2</sup> )	注射	30分	Day1	
	ピンクリスチン (0.6mg/m <sup>2</sup> )	注射	15分	Day1	
DAV+Feron療法	ダカルバジン (100mg/m <sup>2</sup> )	注射	30分	Day1-5	4~6週間間隔
	ニムスチン (60mg/m <sup>2</sup> )	注射	30分	Day1	
	ピンクリスチン (0.6mg/m <sup>2</sup> )	注射	15分	Day1	
	インターフェロンβ (300万単位/body)	注射	局注	Day1-5	
Nivo+Ipi療法 (melanoma)	ニボルマブ (80mg/Body)	注射	30分	Day 1	3週間間隔×4
	イピリブマブ (3kg/kg)	注射	90分	Day 1	
	ニボルマブ (240mg/Body)	注射	30分	Day 1	Day76以降、2週間間隔
Nivolumab【240mg/Body】療法	ニボルマブ (240mg/Body)	注射	30分	Day 1	2週間間隔
Nivolumab【480mg/Body】療法	ニボルマブ (480mg/Body)	注射	30分	Day 1	4週間間隔
Ipilimumab療法	イピリブマブ (3kg/kg)	注射	90分	Day 1	3週間間隔
Pembrolizumab【200mg/Body】療法	ペムブロリズマブ (200mg/Body)	注射	30分	Day 1	3週間間隔
Pembrolizumab【400mg/Body】療法	ペムブロリズマブ (400mg/Body)	注射	30分	Day 1	6週間間隔

## 【 有棘細胞癌 】

レジメン名	投与量	剤型	投与時間	投与日	投与間隔
CPT-11療法	イリノテカン (100mg/m <sup>2</sup> )	注射	90分	Day1・8・15	4週間間隔