【多発性骨髄腫】 2025.01 現在

【 多発性骨髄腫 】					2025.01 現
レジメン名	投与量	剤型	投与時間	投与日	投与間隔
	ピンクリスチン(0.4mg/Body)	注射	24時間	Day1-4	
VAD療法	ドキソルビシン (9mg/㎡)	注射	24時間	Day1-4	4週間間隔
	デキサメタゾン(20mg/Body)	注射	60分	Day1-4	
BOR療法:導入(S.C)	ボルテゾミブ (1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1 · 4 · 8 · 11	3週間間隔
BOR療法:維持 (S.C)	ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1 · 8 · 15 · 22	5週間間隔
PVd療法:cycle1-8	ポマリドミドカプセル(4mg/body)	内服	1810	Day1-14	
	ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1 · 4 · 8 · 11	3週間間隔
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	1810	Day1 · 2 · 4 · 5 · 8 · 9 · 11 · 12	
PVd療法:cycle9-	ポマリドミドカプセル(4mg/body)	内服	1810	Day1-14	3週間間隔
	ボルテゾミブ (1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1 · 8	
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	1810	Day1 · 2 · 8 · 9	
PETHEMA-MPB療法:cycle1	ポルテゾミブ (1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1·4·8·11·22·25·29·32	6週間間隔
	メルファラン (9mg/㎡)	内服	1810	Day1-4	
	プレドニゾロン (60mg/m)	内服	1810	Day1-4	
	ポルテゾミブ (1.3mg/m)	注射	皮下注	Day1 · 8 · 15 · 22	
PETHEMA-MPB療法: cycle2-6	メルファラン (9mg/㎡)	内服	1810	Day1-4	— 5週間間隔
	プレドニゾロン(60mg/㎡)	内服	1810	Day1-4	
		注射		<u> </u>	+
PETHEMA-MPB療法: cycle7-	ポルテゾミブ (1.3mg/㎡)	内服	皮下注	Day1·4·8·11 Day1-45 (隔日投与)	90日間隔
	プレドニゾロン(50mg/Body)		1日1回(48時間毎)		
D\/D泰注:industion ovel-1 4	ポルテゾミブ (1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1 · 4 · 8 · 11	
RVD療法:induction cycle1-4	レナリドミド (25mg/Body)	内服	1810	Day1-14	3週間間隔
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	1810	Day1 · 2 · 4 · 5 · 8 · 9 · 11 · 12	
RVD療法:induction cycle5-8	ポルテゾミブ (1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1 · 4 · 8 · 11	
	レナリドミド (25mg/Body)	内服	1810	2週間服用1週休薬	3週間間隔
	デキサメタゾン(10mg/Body)	内服	1810	Day1 · 2 · 4 · 5 · 8 · 9 · 11 · 12	
	ポルテゾミブ(1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1·8	
RVD療法:maintenance9-	レナリドミド(25mg/Body)	内服	1810	2週間服用1週休薬	3週間間隔
	デキサメタゾン(10mg/Body)	内服	1810	Day1·2·8·9	
	エロツズマブ(10mg/kg)	注射	30mL/hrから開始	Day1 · 8 · 15 · 22	4週間間隔
Eld療法(≧460mg/Body)cycle1-2	デキサメタゾン(8mg/Body)注	注射	15分	Day1·8·15·22	
EI a療法(全46Umg/Boay)cycle I-2	レナリドミド(25mg/Body)	内服	1810	Day1-21	
	デキサメタゾン(28mg/Body)P.o	内服	1810	Day1 · 8 · 15 · 22	
Eld療法(≧460mg/Body)cycle3以降	エロツズマブ(10mg/kg)	注射	120mL/hr	Day1·15	4週間間隔
	デキサメタゾン(8mg/Body)注	注射	15分	Day1 · 15	
	レナリドミド (25mg/Body)	内服	1810	Day1-21	
	デキサメタゾン(28mg/Body)P.o	内服	1810	Day1 · 15	
	デキサメタゾン(40mg/Body)P.o	内服	1810	Day8-22	
EPd療法:cycle1-2	エロツズマブ(10mg/kg)	注射	30mL/hrから開始	Day1·8·15·22	
	ポマリドミドカプセル(4mg/body)	内服	1810	3週間服用1週休薬	
	デキサメタゾン(8mg/Body)	注射	200mL/hr	Day1 · 8 · 15 · 22	
	デキサメタゾン(28mg/Body)	内服	1810	Day1 · 8 · 15 · 22	
	エロツズマブ (20mg/kg)	注射	60mL/hrから開始	Day1	—— 4週間間隔
EPd療法:cycle3-	ポマリドミドカプセル(4mg/body)	内服		3週間服用1週休薬	
	デキサメタゾン(8mg/Body)		15分	Day1	
	デキサメタゾン(28mg/Body)		1810	Day1 ·8 · 15 · 22	
	ダラツムマブ (1800mg/body)	注射		Day1 · 8 · 15	
DBd療法(皮下) cycle1-3	デキサメタゾン(24mg/Body)		15分	Day1-8-15	
	ポルテゾミブ (1,3mg/㎡)		皮下注	Day1-4-8-11	
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服		Day2·4·5·9·11·12	
DBd療法(皮下) cycle4-8	ダラツムマブ (1800mg/body)		皮下注	Day1	3週間間隔
	デキサメタゾン(24mg/Body)注	注射	+	Day1	
	ボルテゾミブ (1.3mg/㎡)	注射		Day1·4·8·11	
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服		Day2·4·5·8·9·11·12	
DBd療法(皮下) cycle9-	ダラツムマブ(1800mg/body)	注射	+	Day1	4週間間隔
DBG A CRIT CHOICE	デキサメタゾン(24mg/Body)注	注射	15分	Day1	
	ダラツムマブ(1800mg/body)	注射	皮下注	Day1·8·15·22	—— 4週間間隔
DLd療法(皮下) cycle1-2	デキサメタゾン(24mg/Body)注	注射	15分	Day1·8·15·22	
SEGGA (IX I / OJOIO I Z	レナリドミド(25mg/Body)	内服	1810	Day1-21	
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	1810	Day2·9·16·23	
DLd療法(皮下) cycle3-6	ダラツムマブ(1800mg/body)	注射	皮下注	Day1·15	4 \# 88 88 88 8
	デキサメタゾン(24mg/Body)注	注射	15分	Day1·15	
	レナリドミド (25mg/Body)		1810	Day1-21	4週間間隔
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	+	Day2·9·16·23	
	ダラツムマブ (1800mg/body)		皮下注	Day1	
		_			\dashv
	デキサメタバン (24mg/Rody) 注	注触	115分	II)av1	
DLd療法(皮下) cycle7以降	デキサメタゾン (24mg/Body) 注 レナリドミド (25mg/Body)	注射		Day1-21	— 4週間間隔

レジメン名	投与量	剤型	投与時間	投与日	投与間隔
DPd療法(皮下) cycle1-2	ダラツムマブ(1800mg/body)	注射	皮下注	Day1 · 8 · 15 · 22	— 4週間間隔
	デキサメタゾン(24mg/Body)注	注射	15分	Day1 · 8 · 15 · 22	
	ポマリドミド (4mg/Body)	内服	1810	Day1-21	
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	1810	Day2·9·16·23	
DPd療法(皮下) cycle3-6	ダラツムマブ(1800mg/body)	注射	皮下注	Day1·15	—— 4週間間隔 ——
	デキサメタゾン (24mg/Body) 注	注射	15分	Day1·15	
	ポマリドミド (4mg/Body)	内服	1810	Day1-21	
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	1810	Day2·8·16·22	
DPd療法(皮下) cycle 7以降	ダラツムマブ(1800mg/body)	注射	皮下注	Day1	4週間間隔
	デキサメタゾン (24mg/Body) 注	注射	15分	Day1	
	ポマリドミド(4mg/Body)	内服	1810	Day1-21	
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	1810	Day2·8·15·22	
D-MPB療法(皮下):cycle 1	ダラツムマブ(1800mg/body)	注射	皮下注	Day1 · 8 · 15 · 22 · 29 · 36	6週間間隔
	ボルテゾミブ (1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1·4·8·11·22·25·29·32	
	デキサメタゾン(24mg/Body)	注射	15分	Day1 · 8 · 15 · 22 · 29 · 36	
	メルファラン (9mg/㎡)	内服	1810	Day1-4	
	プレドニゾロン (60mg/㎡)	内服	1810	Day2-4	
D-MPB療法(皮下):cycle2-9	ダラツムマブ(1800mg/body)	注射	皮下注	Day1·22	6週間間隔
	ボルテゾミブ(1.3mg/㎡)	注射	皮下注	Day1·8·22·29	
	デキサメタゾン(24mg/Body)	注射	15分	Day1·22	
	メルファラン (9mg/㎡)	内服	1810	Day1-4	
	プレドニゾロン (60mg/㎡)	内服	1⊟1□	Day2-4	
D-MPB療法(皮下):cycle10以降	ダラツムマブ(1800mg/body)	注射	皮下注	Day1	4週間間隔
Kd療法(週1回投与):cycle1	カルフィゾミブ (20mg/㎡)	注射	30分	Day1	4週間間隔
	カルフィゾミブ (70mg/㎡)	注射	30分	Day8·15	
	デキサメタゾン(40mg/Body)	内服	1810	Day1 · 8 · 15 · 22	
Kd療法(週1回投与):cycle2-9	ltu	注射	30分	Day1.8.15	4週間間隔
	デキサメタゾン(40mg/Body)	内服	1⊟1□	Day1 · 8 · 15 · 22	
Kd療法(週1回投与):cycle9-	カルフィゾミブ (70mg/㎡)	注射	30分	Day1 · 8 · 15	4週間間隔
	デキサメタゾン(40mg/Body)	内服	1810	Day1 · 8 · 15	
Kd療法(週2回投与):cycle1	カルフィゾミブ (20mg/㎡)	注射	30分	Day1·2	4週間間隔
	カルフィゾミブ (56mg/㎡)	注射	30分	Day8-9-15-16	
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	1810	Day1 · 2 · 8 · 9 · 15 · 16 · 22 · 23	
Kd療法(週2回投与):cycle2-	カルフィゾミブ (56mg/㎡)	注射	30分	Day1 · 2 · 8 · 9 · 15 · 16	4週間間隔
	デキサメタゾン(20mg/Body)	内服	1810	Day1 · 2 · 8 · 9 · 15 · 16 · 22 · 23	