【腎細胞がん】 2025.01 現在

| レジメン名 | 投与量 | 剤型 | 投与時間 | 投与日 | 投与間隔 | | |
|-----------------------------------|----------------------|----|------|------|------------------|--|--|
| Tem療法 | テムシロリムス(25mg/body) | 注射 | 30分 | Day1 | 1週間間隔 | | |
| Nivo+lpi療法 (RCC) | ニボルマブ (240mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | 3週間間隔×4 その後2週間間隔 | | |
| | イピリムマブ(1mg/kg) | 注射 | 30分 | Day1 | 3週間間隔×4 | | |
| Nivolumab【240mg/Body】療法 | ニボルマブ (240mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | 2週間間隔 | | |
| Nivolumab【480mg/Body】療法 | ニボルマブ (480mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | 4週間間隔 | | |
| Nivolumab【240mg】+Cabozantinib療法 | ニボルマブ (240mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | - 2週間間隔 | | |
| | カボザンチニブ(20mg/Body/日) | 内服 | 1810 | 連日服用 | | | |
| Nivolumab【480mg】+Cabozantinib療法 | ニボルマブ (480mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | - 4週間間隔 | | |
| | カボザンチニブ(20mg/Body/日) | 内服 | 1810 | 連日服用 | | | |
| Pembrolizumab【200mg/Body】療法 | ペムプロリズマブ(200mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | 3週間間隔 | | |
| Pembrolizumab400mg/Body】療法 | ペムブロリズマブ(400mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | 6週間間隔 | | |
| Pembrolizumab【200mg】+Axitinib療法 | ペムプロリズマブ(200mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | - 3週間間隔 | | |
| | アキシチニブ(10mg/Body/日) | 内服 | 1820 | 連日服用 | | | |
| Pembrolizumab【400mg】+Axitinib療法 | ペムプロリズマブ(400mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | -6週間間隔 | | |
| | アキシチニブ(10mg/Body/日) | 内服 | 1820 | 連日服用 | | | |
| Avelumab+Axitinib療法 | アベルマブ(10mg/kg) | 注射 | 60分 | Day1 | - 2週間間隔 | | |
| | アキシチニブ(10mg/Body/日) | 内服 | 1820 | 連日服用 | | | |
| Pembrolizumab【200mg】+Lenvatinib療法 | ペムプロリズマブ(200mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | - 3週間間隔 | | |
| | レンバチニブ(20mg/Body/日) | 内服 | 1810 | 連日投与 | | | |
| Pembrolizumab【400mg】+Lenvatinib療法 | ペムプロリズマブ(400mg/Body) | 注射 | 30分 | Day1 | -6週間間隔 | | |
| | レンパチニブ(20mg/Body/日) | 内服 | 1810 | 連日投与 | | | |

【副腎がん】 2025.01 現在

| レジメン名 | 投与量 | 剤型 | 投与時間 | 投与日 | 投与間隔 |
|-------|----------------------|----|------|----------------|-------|
| EDP療法 | ドキソルビシン(40mg/㎡) | 注射 | 全開 | Day1 | 4週間間隔 |
| | エトポシド (100mg/㎡) | 注射 | 2時間 | Day2-4 | |
| | シスプラチン(40mg/㎡) | 注射 | 2時間 | Day3-4 | |
| | ミトタン(開始量1g/日、最大4g/日) | 内服 | _ | ケモ開始1週間以上前から内服 | |