

四国がんセンター

呼吸器内科



カルボプラチン+ペメトレキセド+ＥＧＦＲ（内服）療法を受けられる

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿さま

2017年9月1日　作成
2026年11月12日　改訂


私たち医療スタッフは

Ⅰ．入院や抗がん剤治療に対する不安を軽減し、最良の状態で治療が受けられるようにお手伝いします

Ⅱ．抗がん剤治療の副作用や苦痛を軽減し、安全に治療を続けることができるようにお手伝いします



カルボプラチン+ペメトレキセド+ EGFR（内服）療法のスケジュール



・この他に、アレルギー予防や副作用予防のための点滴があります

・抗がん剤を投与したときに、過敏反応が起こることがあります
過敏症状がでたら、早めに点滴を止めることが大切です
・息が苦しい、胸がドキドキする、吐き気など気分が悪いときは
我慢をしないで、すぐに医療スタッフにお知らせください



治療前の歯科受診について

◆治療時に起こる口のトラブルを予防し治療が円滑に進むように、治療開始前の歯科診察を行っています

◆治療前の歯科受診では、以下を行います
- レントゲン検査・診察（口腔内の状態を診る）
- 歯ブラシだけではとれない細菌の除去
- 適切なセルフケア（歯磨き、うがい）指導

◆通常1～2回の受診で終えることができます

口の中はとても細菌の多い場所です
治療中や治療後にその細菌が悪影響を及ぼすことがあります
特に、治療後の口内炎・肺炎等を防ぐには治療前から口の中を
きれいにし細菌をできるだけ減らしておくことが有効です



排便について

普段からご自身の便の性状を確認し、入院中に排便調整の目安や方法を医療スタッフと一緒に確認しておきましょう

排便回数が４回以上増えたとき、下記の表の６（泥状便）～７（水様便）の排便が続くとき、周期的に腹痛があるときはすぐに医療スタッフに伝えましょう

３日以上排便がない、いきまないと便が出ない、便は毎日出ているがすっきりしない腹部膨満感などの症状があるときは、排便回数や性状によって緩下剤を使用します

※排便の状況や下痢・便秘の辛さは人によって違います
※排便のコントロールが難しい場合は看護師と解決方法を相談しましょう

便の性状について（ブリストルスケール）

ブリストルスケールは、便のタイプ（硬さ）を７種類に分類した世界共通の尺度です
自分の便のタイプを知り、排便調整の参考にしましょう

1	コロコロ便		硬くてコロコロの 兎糞状の便
2	硬い便		ソーセージ状であるが 硬い便
3	やや硬い便		表面にひび割れのある ソーセージ状の便
4	普通便		表面がなめらかで柔らかい ソーセージ状、あるいは 蛇のようなとぐろを巻く便
5	やや軟らかい便		はっきりとしたしわのある 柔らかい半分固形の便
6	泥状便		境界がほぐれて、ふにゃふにゃの不定形の小片便 泥状の便
7	水様便		水様で、固形物を含まない 液体状の便

入院中の生活の注意点



◆治療中は免疫力低下のため、感染リスクが高くなります
マスクの着用、手洗い・うがいをしましょう
入院中、手洗いの動画をテレビの無料チャンネルで視聴できます
◆口の中は清潔にするよう心がけましょう
◆排泄を促すために水分をしっかりとりましょう
◆膀胱に尿が溜まったままの状態は、腎臓や膀胱に負担がかかり炎症を起こすことがあります
尿意を感じたら、我慢をしないでトイレに行きましょう
◆排尿時に痛みや残尿感がある場合には看護師にお伝えください
◆正しく安全に点滴を投与するために輸液ポンプを使用します
・点滴が入っている部位を曲げたり、ねじったり、また、点滴チューブをひっぱったりしないようにしてください
・歩行時は、点滴台を支えにして歩くと転倒する可能性があります
点滴台は、支えにしないようにしましょう

こんなときは看護師にお知らせください
＊輸液ポンプを使用しているときに機器のアラーム音が鳴ったとき
＊点滴が入っている部位に違和感や痛みを感じたり、腫れてきたとき



◆抗がん剤治療開始から治療後２日間ほどは、尿や便などから抗がん剤が排出されます
尿や便に直接触れても健康に直接被害を及ぼすことはありませんが、できるだけ周りに広げないように以下のことに注意しましょう

・男性の方は飛び散り防止のため、座って排尿しましょう





・尿がこぼれた場合は、トイレットペーパーできれいに拭き取りトイレに流しましょう
２度拭き取ると良いでしょう

・トイレの後、フタがある場合は、
フタをして水を２回流しましょう



・ナプキンや尿とりパッドを使用している場合は、看護師にお知らせください
＊使用済みのナプキンや尿とりパッドは、ナイロン袋に入れて口を結びましょう
＊トイレからナースコールを押して、看護師に渡しましょう

・トイレのあとは石けんなどでよく手を洗いましょう
・尿や吐いてしまったもので衣類が汚れた場合は、ほかの洗濯物と分けて洗濯しましょう

スキンケアに関する習慣の把握について

この薬は、皮疹などの皮膚の副作用が出やすい特徴があります
退院して外来通院となった後も継続的にスキンケアを実践することでそれらの副作用が軽減されます
そのため、日常の生活習慣を振り返りながらスキンケアの方法を学んでいくことが重要になります
入院中にご自身の日常生活習慣を振り返りながらスキンケアの方法について看護師から説明がありますので、治療開始日までに以下の該当する項目にチェックをお願いします

食事

・食事を準備するのは誰ですか？
　□自分　□家族（　　）　□その他（　　）



排便

・排便の硬さはどうですか？
　□硬め　　□柔らかめ　　□その他（　　）

活動

・屋外での活動が多いですか？
　□はい　内容（　　）　　□いいえ


入浴

・石けんは何を使いますか？
　□固形石けん　　□液状ソープ　　□泡ソープ
・体はどうやって洗いますか？
　□ナイロンタオル　　□タオル　　□手だけ



お薬

・薬はだれが管理していますか？
　□自分　　□家族（　　）　□その他（　　）



ウィッグ展示室



ウィッグ　帽子　ヘア用品　ネックカバーなど



ウィッグ以外にも
お役立ち製品が色々♪



メイク　ネイル用品

治療によって脱毛・肌や爪のトラブルが起こる可能性がある方に、上記展示品の案内や試着を行っています

お住まいの自治体によっては、治療に伴うウィッグに関する助成制度を設けています
詳しくは、本館２階『がん相談支援センター』でご相談ください

※暖だんでの販売は行っておりません
　気になる製品については購入方法をお伝えしています

ダイアリー

このパンフレットには、 当院での標準的な治療や日常生活で注意していただきたいポイントなどを記載しています

また、よりよい状態で退院を迎えられるように患者さんご自身の目標と医療スタッフの目標をあげています

入院は、約３週間の予定です

治療後の回復は、個人差があり、体の状態によっては、予定どおりにすすまないこともありますが、その都度対応していきますのでご安心ください

私たち医療スタッフは、これからの入院生活を不安なく送れるように支援させていただきます



入院日～治療前日　　月　　日～　　月　　日



今日の目標
- 治療の必要性、副作用について理解できる
- 医療スタッフの説明が理解できる
- ビタミン剤を自分で管理し、飲むことができる

＜時間＞　＜予定＞

11：00　入院

【入院後に以下のことを予定しています】
- 看護師から病院内、病棟内、入院生活の説明
（テレビの病院案内も参考にしてください）

12：00　昼食
- 検温、血圧測定、身体測定
- 連絡先、既往歴、生活習慣などの聞き取り
- 血液検査、尿検査、レントゲン検査
- 医師より治療の説明があります
- サインをした同意書は看護師にお渡しください
- わからないことやもう少し詳しく説明を聞きたいことなどがありましたら、遠慮なくお尋ねください

治療の流れや注意事項について説明します
過敏症、点滴部位の痛み・血管痛について説明します
「がん化学療法を受けられる方へ」パンフレット参照

＜お薬＞
- 他の病院で処方された薬は、一度お預かりします
医師に確認後、続けるか、中止するかをお伝えします
- ビタミン剤（パンビタン粉末）を正しく飲めているか確認します

＜食事＞
- 食物アレルギーのある方は、医療スタッフにお知らせください
- 基礎疾患（糖尿病、高血圧等）がある方は、治療食になる場合があります
- 初回治療のときは、管理栄養士より病院食や食事の工夫について説明があります

18：00　夕食

２回目以降、味覚障害や食欲不振等がある場合、栄養指導を希望される場合は、お知らせください

21：30　消灯

＜清潔＞
- 治療前日は、シャワー浴をしましょう


決められた時間にパンビタン粉末を飲みましょう



薬剤師から治療の流れや副作用の説明があります
薬について詳しく記載された冊子をお渡しします



医療スタッフの目標
- 入院生活や抗がん剤治療に対する不安や心配ごとがないように支援します



治療１日目　　月　　日



今日の目標
- 予定どおり、安全に治療を受けることができる
- 治療のために処方された薬を正しく飲むことができる

＜時間＞　＜予定＞

6：00 ― 起床
検温
血圧測定

水分をしっかりとりましょう
治療日誌を記入しましょう

決められた時間に
パンビタン粉末を
飲みましょう



7：30 ― 朝食

- 抗がん剤を服用します
- **看護師がお持ちします**
- 内服後は手を洗いましょう

10：00 ― 検温
血圧測定

- 点滴は約１時間の予定です
  開始時刻については、看護師からお知らせします
  （　　）時から、点滴をします

※抗がん剤の点滴前後で血圧、脈拍を測定します
- 初めて治療を受ける場合は、アレルギー症状の早期発見のために、抗がん剤投与前から終了まで心電図モニターを胸に装着します
- 治療前に、トイレに行きましょう
- 点滴中は管を無理に引っ張ったり、針の入っているところを押さえたりしないようにしましょう
- 点滴が終了後、シャワー浴ができます
  体調に合わせて体を拭くこともできます
  看護師がお手伝いします

12：00 ― 昼食



フタをして
水を２回流しましょう

＜時間＞　＜予定＞

・針の入っているところが赤い、腫れている、痛みがある
ときはすぐにお知らせください
・呼吸が苦しい、吐き気がする、胸が苦しい、体がかゆい、
気分が悪いときは、我慢をしないでお知らせください
・眠気が強いとき、めまいやふらつきがあるときは、動く前に
ナースコールをしてください

吐き気・嘔吐、味覚障害・食欲不振、倦怠感
について説明します
「がん化学療法を受けられる方へ」パンフレット参照

18：00　夕食

19：00　検温
血圧測定

・ＥＧＦＲ阻害剤の皮膚症状について
・治療の流れについて
・皮膚症状の出る時期を知ろう
について説明します
「ＥＧＦＲ阻害剤の治療を受ける方へ」参照

21：30　消灯

医療スタッフの目標
・アレルギー症状や副作用症状の早期発見に努めます
・抗がん剤の血管外漏出予防に努めます



治療２日目～３日目　　月　　日～　　月　　日



今日の目標
- 副作用症状があれば、医療スタッフに知らせることができる
- 治療のために処方された薬を正しく飲むことができる

＜時間＞　＜予定＞

6：00 起床

水分をしっかりとりましょう
治療日誌を記入しましょう

7：30 朝食

決められた時間に
パンビタン粉末を
飲みましょう



- 抗がん剤を服用します
- **看護師がお持ちします**
- 内服後は手を洗いましょう

10：00 検温
血圧測定

フタをして
水を２回流しましょう



12：00 昼食

治療２日目：便秘、下痢
治療３日目：口内炎、神経障害、皮膚障害、爪のトラブル
について説明します
「がん化学療法を受けられる方へ」
「がん治療による爪のトラブルについて」パンフレット参照

- 副作用の対処方法や日常の過ごし方など不明な点があれば
  お知らください
- 吐き気や口内炎などで食事が食べにくいときは、食事内容を
  変更できます

シャワー浴をしましょう

18：00 夕食

治療２日目：
- スキンケア（肌の手入れ）について
- 洗顔、洗髪、体を洗うときの肌に優しい工夫

治療３日目：
- 爪の手入れで気をつけること
- 爪切り、テーピング

について説明します
「ＥＧＦＲ阻害剤の治療を受ける方へ」参照

21：30 消灯

医療スタッフの目標
- 副作用症状の早期発見に努めます
- 不安なく療養できるように支援します
- 抗がん剤の血管外漏出予防に努めます



治療４日目～６日目　　月　　日～　　月　　日



今日の目標
- 副作用症状があれば、医療スタッフに知らせることができる
- 治療のために処方された薬を正しく飲むことができる

＜時間＞　＜予定＞

6：00　起床

7：30　朝食

10：00　検温
血圧測定

12：00　昼食

18：00　夕食

21：30　消灯

水分をしっかりとりましょう
治療日誌を記入しましょう

決められた時間に
パンビタン粉末を
飲みましょう



- 抗がん剤を服用します
- **看護師がお持ちします**
- 内服後は手を洗いましょう



フタをして
水を２回流しましょう

治療４日目：骨髄毒性
治療５日目：肺障害、息切れ・動悸
治療６日目：脱毛
について説明します
「がん化学療法を受けられる方へ」パンフレット参照
「がん治療による脱毛に備えて（頭髪編）」参照

- 副作用の対処方法や日常の過ごし方など不明な点があれば
  お知らください
- 吐き気や口内炎などで食事が食べにくいときは、食事内容を
  変更できます

シャワー浴をしましょう

治療４日目：外出時に気をつけること
　　その他注意すること
治療５日目：お化粧で気をつけること
　　ひげ剃りで気をつけること
治療６日目：塗り薬の使い方
　　・ステロイド外用剤とは？
　　・注意すること
について説明します
「ＥＧＦＲ阻害剤の治療を受ける方へ」参照

医療スタッフの目標
- 副作用症状の早期発見に努めます
- 不安なく療養できるように支援します



治療７日目～９日目　　月　　日～　　月　　日



今日の目標
- 副作用症状があれば、医療スタッフに知らせることができる
- 治療のために処方された薬を正しく飲むことができる
- ３７.５℃以上の発熱がない

＜時間＞　＜予定＞

6：00　起床
水分をしっかりとりましょう
治療日誌を記入しましょう

7：30　朝食
抗がん剤を服用します
抗がん剤はセーフティーボックスに入れて保管しましょう

決められた時間にパンビタン粉末を飲みましょう



9：30　血液検査、レントゲン検査（治療８日目）

10：00　検温
血圧測定

フタをして
水を２回流しましょう



12：00　昼食

治療７日目：腎機能障害、浮腫について説明します
「がん化学療法を受けられる方へ」参照

- 副作用の対処方法や日常の過ごし方など不明な点があればお知らください
- 吐き気や口内炎などで食事が食べにくいときは、食事内容を変更できます

シャワー浴をしましょう


18：00　夕食

治療７日目：皮膚症状の対処方法について
- かゆみがでたとき
- 飲み薬の使い方

治療８日目：各薬剤の使用時期について
皮膚障害が悪化したときについて
治療９日目：相談窓口の紹介
について説明します
「ＥＧＦＲ阻害剤の治療を受ける方へ」参照

21：30　消灯

医療スタッフの目標
- 副作用症状の早期発見に努めます
- 不安なく療養できるように支援します



治療１０日目～１１日目　　月　　日～　　月　　日



今日の目標

- 副作用症状があれば、医療スタッフに知らせることができる
- 治療のために処方された薬を正しく飲むことができる
- ３７.５℃以上の発熱がない

＜時間＞　＜予定＞

水分をしっかりとりましょう
治療日誌を記入しましょう

決められた時間に
パンビタン粉末を
飲みましょう



6：00　起床

7：30　朝食

抗がん剤を服用します
抗がん剤はセーフティーボックスに
入れて保管しましょう

9：30　血液検査（１０日目）

10：00　検温、血圧測定

フタをして
水を２回流しましょう



12：00　昼食

治療11日目：静脈血栓塞栓症、体液貯留について説明します
薬剤師がお渡しした冊子参照


- 副作用の対処方法や日常の過ごし方など不明な点があれば
  お知らください
- 吐き気や口内炎などで食事が食べにくいときは、食事内容を
  変更できます

シャワー浴をしましょう

感染予防のために手洗い・うがいは
しっかりしましょう

18：00　夕食

息が苦しくなった、咳が増えた、皮疹（発疹）が出た、
３７.５℃以上の熱が出たときなどは、すぐにお知らせ
ください



21：30　消灯

医療スタッフの目標
- 副作用症状の早期発見に努めます
- 不安なく療養できるように支援します



治療１２日目～退院前日　　月　　日～　　月　　日



今日の目標
- 副作用症状があれば、医療スタッフに知らせることができる
- 治療のために処方された薬を正しく飲むことができる
- ３７.５℃以上の発熱がない
- 退院後の日常生活の注意点について理解できる

＜時間＞　＜予定＞

水分をしっかりとりましょう
治療日誌を記入しましょう

6：00　起床

7：30　朝食

抗がん剤を服用します
抗がん剤はセーフティーボックスに入れて保管しましょう

決められた時間にパンビタン粉末を飲みましょう



9：30　血液検査、レントゲン検査（１５日目）

10：00　検温、血圧測定

フタをして
水を２回流しましょう



12：00　昼食

- 副作用の対処方法や日常の過ごし方など不明な点があればお知らください
- 吐き気や口内炎などで食事が食べにくいときは、食事内容を変更できます

【次回外来で治療予定の方】
退院までに通院治療室の見学に行きます
「外来で抗がん剤点滴治療を受けられる方へ」ページ参照


★退院前日
退院後の日常生活について説明します
「退院後の日常生活について」ページ参照

シャワー浴をしましょう

感染予防のために手洗い・うがいはしっかりしましょう

18：00　夕食

息が苦しくなった、咳が増えた、皮疹（発疹）が出た、３７.５℃以上の熱が出たときなどは、すぐにお知らせください



21：30　消灯

医療スタッフの目標
- 副作用症状の早期発見に努めます
- 不安なく療養できるように支援します
- 退院後の日常生活に不安がないように支援します



退院日　　月　　日



今日の目標
- 治療のために処方された薬を正しく飲むことができる
- ３７.５℃以上の発熱がない
- 退院後の日常生活の注意点について理解できる
- 退院できる

＜時間＞	＜予定＞
６：００	起床 検温、血圧測定
７：３０	朝食
	次回外来予約票をお渡しします
１０：００	退院 退院前に忘れ物がないようにご確認ください 「入院診療費料金連絡票」を病室にお届けしますので、 ２階医事受付窓口でお支払ください

水分をしっかりとりましょう
治療日誌を記入しましょう

抗がん剤を服用します

決められた時間に
パンビタン粉末を
飲みましょう





フタをして
水を２回流しましょう

ビタミンＢ１２の筋肉注射は、９週間ごと（約２～３か月）に
外来または入院で実施します

医療スタッフの目標
- 退院後の日常生活に不安がないように支援します





体調の変化や副作用症状を書きとめていきましょう

月／日			月／日		
1日目	／		8日目	／	
2日目	／		9日目	／	
3日目	／		10日目	／	
4日目	／		11日目	／	
5日目	／		12日目	／	
6日目	／		13日目	／	
7日目	／		14日目	／	

体調の変化や副作用症状を書きとめていきましょう

月／日		
15日目	／	
16日目	／	
17日目	／	
18日目	／	
19日目	／	
20日目	／	
21日目	／	





外来で抗がん剤点滴治療を受けられる方へ

通院治療の流れ

① 受付



B受付

② 採血
中央処置室



☆採血時のお願い☆
採血時に注意することは退院前に確認しておきましょう
点滴予定の腕とは反対の腕で採血しましょう



③ 診察受付

採血結果が出るまで、
約３０分～１時間かかります

④ 診察

A受付
呼吸器科
消化器科
緩和ケア
感染症腫瘍内科
骨軟部腫瘍・整形外科
禁煙外来

B受付
泌尿器科
血液腫瘍内科
原発不明がん診療科

C受付
乳腺外科
婦人科
形成外科
頭頸科・甲状腺腫瘍外科
歯科
病理診断科

S受付
消化器内科
糖尿病内科
内分泌内科
循環器内科
皮膚科
眼科
精神科
脳神経外科
リンパ浮腫
がんゲノム医療外来

治療決定

S受付

⑤ 治療
通院治療室

看護師が点滴の針を刺し、
確認後に抗がん剤を開始します

治療終了

検査や他の診療科で診察のある方は、各受付へ

検査の説明を受ける方は、予約センターへ

予約センターは
B受付の隣です



⑥ 会計

処方箋もすべてファイルに入れたまま総合受付６番窓口に提出してください。

＊お薬の処方がある方へ
６番窓口で処方箋をお渡しします。４日以内にお薬をお受け取りください。

通院治療室での過ごし方

●外来で初めて治療を受ける方は、説明と確認を行うため、少し時間がかかります。

●入室時に、ベッドか椅子を選択できますが、混雑時にはご希望に添えないこともあります。

●テレビは無料で利用できます。ラジオや音楽プレイヤー等の持ち込みも可能です。
ご利用される場合にはイヤホンをご用意ください。

●携帯電話はマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。

●通院治療室内での飲食は可能ですが、においの強いものはご遠慮ください。
飲食される方は、各自でご準備ください。

●トイレは通院治療室内のトイレをご使用ください。
男女兼用ですが、３か所あります。

●付き添いは原則ご遠慮いただいております。
ご家族の待機場所として「暖だん」や「図書コーナー」などがあります。

●副作用や日常生活で困っていることや相談したいことがあれば、いつでも
スタッフに声をおかけください。









退院後の日常生活について

●発熱・感染予防

抗がん剤の影響で白血球が減少し、感染しやすくなることがあります

・手洗い、うがいを行いましょう
・人混みではマスクを着用しましょう
・３７.５℃以上の発熱がある場合は、病院へご連絡ください

●呼吸

まれに肺障害が起こることがあります

・息苦しさがあるとき
・咳が続くとき
・息切れが強くなったとき
・発熱を伴うとき

このような症状がある場合は、早めにご連絡ください

●皮膚

ＥＧＦＲ阻害薬の影響で皮膚症状が現れることがあります

・保湿剤を使用しましょう
・日焼けを避けましょう
・外出時は帽子や日焼け止めを使用しましょう

以下のような症状がある場合は、外来受診時に医療スタッフへお伝えください

・発疹が出たとき、発疹が広がったとき
・かゆみが強いとき
・皮膚の痛みがあるとき
・爪の周囲が赤く腫れたとき

●下痢

ＥＧＦＲ阻害薬の影響で下痢が起こることがあります

・水分を十分に摂りましょう
・消化のよいものを食べましょう

次のような症状があるときはご連絡ください

・強い下痢が続くとき
・水分が十分に摂れないとき
・強い腹痛があるとき

●食事




無理をせず食べられるものを選びましょう
少量ずつ回数を分けて食べることも効果的です
味覚障害や食欲不振等がある場合、栄養指導を希望される場合はお気軽にお声かけください
自宅で調理をしている方など、一緒に管理栄養士の話を聞きたい方がいる場合は一緒に来院してください

●口腔ケア

毎食後の歯みがきとうがいを続けましょう
口の中を清潔に保ちましょう
口内炎や口の痛みがある場合はご相談ください

●お薬



パンビタン粉末（葉酸）は副作用を軽減するための大切な薬です
・医師の指示どおりに内服しましょう
・自己判断で中止しないでください
・ビタミンＢ１２注射は、外来で継続します
他の病院の薬を服用する場合は、医師に相談してください
服用しても症状が改善されない場合は、病院にご連絡ください

●治療日誌を活用しましょう

毎日の体調や気になる症状を記録しましょう
外来受診時にお持ちいただくことで、体調変化の確認に役立ちます
自宅療養中に気がかりなことがありましたら、外来受診時に「治療日誌」をご用意のうえ、主治医にご相談ください
次回治療時にもお持ちください

●こんな症状に注意しましょう

・片方の足の腫れ・痛み、急な息苦しさや胸の痛み
・むくみや急な体重増加、息苦しさ
気になる症状がある場合は、我慢せず、すぐに病院へご連絡ください

●活動

体調に合わせて無理なく過ごしましょう
散歩など軽い運動を続けましょう

●仕事

これから先、安心して働き続けるためには
体の状態に合わせた休み方や働き方が必要になることもあります
病院では、患者さんの「働きたい！」をサポートしています
ご相談は、がん相談支援センターへお問い合わせください



ちりょうさ
厚生労働省『治療と仕事の両立支援』キャラクター



- ３７.５℃以上発熱があるとき
- 息切れや咳が悪化したとき
- 皮疹が急に増えたとき
- 皮疹が悪化したとき
- 爪の周囲が赤く腫れたとき
- 水分・食事がほとんどとれない日が続くとき
- 下痢が続くとき

上記のような症状がある場合やその他ご心配なことがある場合は
がん相談支援センターにご連絡ください

◆四国がんセンターの連絡先◆

【平日】　８：３０～１７：１５
四国がんセンター　がん相談支援センター
（直通番号）　０８９-９９９-１１１４

【平日上記時間外および土・日・祝日】
日直/夜間当直師長
（代表番号）　０８９-９９９-１１１１

翌日以降の外来受診日や検査予約日の変更
【平日】　１３：００～１７：００
四国がんセンター　予約センター
（直通番号）　０８９-９９９-１１１２



カルボプラチン+ペメトレキセド+ＥＧＦＲ（内服）療法を受けられる方へ