

四国がんセンター  
婦人科

# 婦人科手術を 受けられる方へ

\_\_\_\_\_さま

開腹付属器腫瘍摘出術

独立行政法人国立病院機構

四国がんセンター

婦人科\_\_\_\_\_病棟

主治医／担当医【\_\_\_\_\_】

受け持ち看護師【\_\_\_\_\_】

2004年7月16日 作成  
2024年2月15日 改定

私たち医療スタッフは

- I. 入院や手術に対する不安を軽減し、最良の状態  
治療が受けられるようにお手伝いいたします
  
- II. 手術後の苦痛を軽減し、合併症を起こさず順調に  
回復され、安心して退院を迎えられるよう  
お手伝いいたします



## 手術までに準備していただきたいこと

- 他の病院で処方され、現在服用している薬がある方は、入院時に必ずお持ちください（入院中は原則、他の病院の受診ができないため、入院期間を含め、余裕をもってお持ちください）
- **お薬手帳をお持ちの方は、入院時に必ずお持ちください**
- サプリメントを飲んでいる方は必ずお申し出ください
- 爪は短く切り、マニキュア、ペディキュア、ジェルネイル、スカルプネイルをされている方は、入院前に落としておいてください
- まつげのエクステーションをされている方は、お知らせください
- 指輪は入院までに外しておいてください  
難しい場合は事前に医療スタッフまでご相談ください

<以下のものは病院で貸し出し、購入もできます>

- 術衣（手術後用）、病衣
- バスタオル 2枚
- フェイスタオル 2枚
- ティッシュペーパー 1箱
- 紙おむつ（マジックテープ式） 3枚
- 腹帯 2枚

「CSセットのご案内」冊子を参考にしてください

「入院される方へ」のパンフレットを参考にしてください

<ご自宅からお持ちください>

- コップ（割れないもの）
- 曲がるストロー2本、または吸い飲み
- 水 ペットボトル500ml 2本
- 前開きの上着（手術衣の上に着用します）
- 大きくゆとりのある、締め付けないズボン、下着（パンツ）  
（普段よりひとサイズ大きいものを準備してください）
- ビニール袋 3枚（靴、パジャマ、下着などを入れるために使います）
- ナプキン（普通の日用）



\*タオル、歯ブラシ、コップ、ティッシュペーパーなどご自身の持ち物に氏名をお書きください

**※説明書・同意書（手術・輸血・麻酔）がお手元にある方は忘れずお持ちください**

### 医療品ショップ くろ〜ば〜

場所 2階 中央処置室前  
営業時間 8:30~17:00  
定休日 土・日・祝日・年末年始  
電話 (089) 999-1129



# ダイアリー

このパンフレットには、当院での標準的な治療や日常生活で注意していただきたいポイントなどを記載しています

また、よりよい状態で退院を迎えられるよう患者さんご自身の目標と医療スタッフの目標をあげています

入院は約2週間の予定です

手術後の回復は、個人差があり、体の状態によっては予定どおりにすすまないこともあります。その都度対応していきますので、ご安心ください

私たち医療スタッフは、これからの入院生活が不安なく送られるようにサポートさせていただきます



# 手術前の歯科受診について




手術時、手術後のトラブルを防ぐために歯科受診が必要です

## 1. ぐらつきのある歯への対応

→全身麻酔の際、気管にチューブを入れるとき、歯が欠けたり抜けたりすることを予防する



マウスピース作製




歯と歯の間を接着固定

## 2. 口の中の清掃（歯石取り、入れ歯のチェック）

→ばい菌が体に悪影響を及ぼすリスクを避ける

手入れの行き届いていない口の中



手入れの行き届いていない口の中は  
ばい菌でいっぱいです

これまで歯科受診をされていない方は、今後の方針についても相談にのります  
「かかりつけ歯科医院」をもつようにしましょう



今日の目標

- ・入院生活、手術について医療スタッフの説明が理解できる
- ・わからないことは質問することができる

<時間>

<予定>

13:00

入院

【入院後に以下のことを予定しています】

- ・看護師から病院内、病棟内、入院生活の説明（テレビの病院案内も参考にしてください）
- ・検温、血圧測定、身体測定
- ・連絡先、既往歴、生活習慣などの聞き取り
- ・歯科受診
- ・術前呼吸訓練、機能訓練
- ・血液検査、尿検査
- ・外来で手術の説明を受けていない場合は、医師より手術の説明があります
- ・説明を聞いた後、納得し同意できれば同意書にサインをし、看護師にお渡しください
- ・わからないことやもう少し詳しく説明を聞きたいことなどがありましたら、遠慮なくお尋ねください
- ・手術に必要な物を準備します

18:00

夕食

<お薬>

- ・他の病院で処方された薬は、一度お預かりします  
医師に確認後、続けるか、中止するかをお伝えします  
また、入院1か月前までに服用していた薬があればお知らせください  
手術3日前から下剤を服用します  
\*便秘傾向の方は看護師にお知らせください

<食事>

- ・食物アレルギーのある方は医療スタッフにお知らせください
- ・特に制限はありません

21:30

消灯


- ・基礎疾患（糖尿病・高血圧等）がある方は、治療食となる場合があります

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

医療スタッフの目標

- ・安心して入院生活を送られるよう支援します
- ・手術の準備をすすめられるよう支援します



手術2日前

月

日



### 今日の目標

- 手術について医療スタッフの説明が理解できる

<時間>

<予定>


6:00	起床
7:30	朝食 朝食後、便を柔らかくする薬を服用します
10:00	検温、血圧測定
12:00	昼食 昼食後、便を柔らかくする薬を服用します  横になったままで、うがい、深呼吸、体の動かし方の練習をしましょう
18:00	夕食 夕食後、下剤を服用します
21:30	消灯

シャワー浴ができます  
活動に制限はありません

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

- 医療スタッフの目標
- 手術の準備をすすめられるよう支援します





## 手術前の機能訓練

体を動かすことにより、痰を出しやすくし、血液循環を良くして傷の治りを早めます  
また腸の動きを良くして、ガスを出すなど回復を早めることができます

### ●深呼吸

- ①仰向けに寝て全身の力を抜きます
- ②鼻から大きく息を吸います
- ③口からゆっくりと息を吐き出します  
吸う息より吐く息の方を長めにしましょう



### ●痰の出し方

- ①傷口を手で押さえる、あるいは脇をしめて、小さな咳を2～3回して、徐々に痰を上に向けていきます
- ②最後に少し大きな咳をすると楽に痰を出せます

### ●うがい

うがいをすることにより、口の中を清潔にしましょう  
痰も出しやすくなります

- ①寝たままで顔を横に向けて、うがいをします
- ②静かに舌で流しだすようなイメージで水を吐き出します  
このとき飲み込まないように注意しましょう

## ●体の動かし方

麻酔がさめたら、横向きになってみましょう


手術後に体を動かすことは、痛みをともないつらいと思いますが、

- (1) 痰を出しやすくする
- (2) 血液循環を良くして傷の治りを早める
- (3) 腸の動きを良くしてガスを出す

など、回復を早めることができますので、積極的にがんばりましょう

### —横の向き方—

- ①傷口を片手で押さえ、両膝を立ててお腹の筋肉をゆるめます
- ②腰を浮かせて体を向ける反対側へ腰の位置をずらします
- ③ゆっくりと体を横に向けます



### —起き上がり方—

- ①ベッドのリモコンを操作してゆっくり90度まで起こします
- ②足をベッドから下ろします
- ③手をベッドについて、ゆっくりと体を起こします

# 手術前日 月 日



## 今日の目標

- 手術について医療スタッフの説明が理解できる
- 不安な気持ちを医療スタッフに伝えることができる


<時間>	<予定>	
6:00	起床	<活動> • 活動に制限はありません
7:30	朝食	<手術前処置> • おへその掃除をします • 上腹部から下腹部（陰部）にかけて除毛します • 手術前の準備が終わればシャワー浴をしましょう • 手術に必要な物の確認をします
10:00	検温 血圧測定 血液検査 手術前処置 シャワー浴	手術室の看護師から説明があります I C U（集中治療室）に入室する場合は、 I C Uの看護師から説明があります
12:00	昼食	<食事> • 食事は低残渣食または流動食（消化の良い食事）を準備しています • 病院で提供する食事以外の物は食べないでください • 水分はできるだけ多く摂取しましょう 目安として1000ml以上を目指しましょう • 21時以降は絶食です （翌朝6時30分まで水200ml程飲んでかまいません） • うがいや歯磨きは21時以降もできます
13:00	下剤の服用	
18:00	夕食	<お薬> • 排便を促すために13時頃に下剤を服用します （水薬2種類 200ml） • 眠れない場合は安定剤を服用することができます 21時頃に少量の水で服用します
21:30	消灯	

## MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

## 医療スタッフの目標

- 手術の準備をすすめられるよう支援します
- 手術に対する不安がないよう支援します





## ご家族の方へ

手術当日は（ ）時までに病棟にお越しください

手術中は、必ず院内でお待ちください（2階フロア・4階家族控え室など）

**必ず所在を明らかにし、連絡が取れるようお願いいたします**

手術後、主治医から手術の結果について説明があります

他の患者さんの手術の関係で、手術後すぐに説明できない場合は

お待ちいただくことをご了承ください

## ICU（集中治療室）に入室する患者さんのご家族の方へ

手術が終わりましたら、病棟看護師がICUへ案内します

手術後ICU前室にて医師より手術結果について説明があります

手術当日は来院に30分以上かかる場合は、患者宿泊施設「向日葵」に宿泊をお願いしています

\* ICU面会時は、患者さん用エレベーターをご利用ください

病室にて付き添いを希望される場合には、医師の許可が必要となりますので、看護師にお申し出ください


布団のレンタルを希望される場合は、2階 医療品ショップ「くろ〜ば〜」でお尋ねください

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

### 医療スタッフの目標

- ・ 予定どおりに手術が受けられるよう支援します





### 手術後の目標

- ・痛みを我慢せず、医療スタッフに伝えることができる

手術後は、時間を決めて以下のことを行います

### 検温、血圧測定、状態観察

- ・帰室時、帰室後15分、30分、1時間、2時間、以後2時間ごとに行います（これ以外も必要なときに測定します）

### 深呼吸

- ・目が覚めたら大きく深呼吸をしましょう

### うがい

- ・ベッドに横になったまま行います（看護師がお手伝いします）
- ・医師の許可があるまで、飲水はできません

### 活動

- ・ベッドの頭もとを少し上げます
- ・足首の屈伸や膝立、腕の運動は痛みがない程度に自分で行いましょう
- ・手術2時間後頃より、体を横向きにすることができます
- ・体を横向きにするときは、看護師がお手伝いします
- ・手術6時間後頃より、枕を使用できます

### 手術後の傷

- ・傷口は透明なテープでとめています
- ・傷口のテープは、数日は貼ったままで傷の観察をします

### 背中の中の管（硬膜外麻酔）


- ・背中（硬膜外）に入った管から、痛み止めのお薬が持続的に入ります
- ・痛みを我慢する必要はありません
- ・痛みが強い場合は追加で痛み止めを使います

### 排液のための管

- ・溜まった血液などを出すために、手術をした部位に管（ドレーン）が入ります

### 医療スタッフの目標

- ・術後合併症の早期発見に努めます
- ・床ずれの予防に努めます



# 手術後の患者さんの様子

## 心電図モニター

- 手術後の状態を安全に管理します
- 血圧を測定するための点滴の管が動脈に入っています

## 血圧計

- 適宜測定します

## 酸素マスク

- 麻酔が完全に覚めるのを助け、手術後の呼吸状態を安定に保ちます
- 翌朝まで酸素吸入を行います

## 酸素濃度測定器


体の酸素の状態を観察します

## 点滴

- 手術の後は飲んだり食べたりできないため点滴があります
- 血栓予防の注射があります

## 尿の管

手術中に尿をとる管が入ります




急に動くとチューブ類が抜ける場合がありますので、体の向きを変えたいときは看護師にお知らせください

## 手術後の痛みについて

手術後の痛みについては、痛みの程度を看護師が数字でお聞きします（NRS）  
数字での表現が難しいときは、フェイススケールでお答えください


### 1) NRS



全く痛くない

これ以上耐えられないほど  
ひどい痛み

### 2) フェイススケール





## 今日の目標

- 安静にしているときの痛みがない
- 見守りのもと病棟内を歩くことができる
- 排ガスがある

&lt;時間&gt;

&lt;予定&gt;

7時までは2～3時間ごとの検温があります

6:00

起床  
 温かいタオルをお持ちします  
 ベッドに座って洗面、歯磨きをしましょう

医師の許可が出れば  
 水分をとることができます  
 昼から全粥食が始まります

酸素吸入を終了します（6:00～8:00頃まで）

9:00

血液検査  
 血栓予防の注射と点滴があります

医師の指示で内服薬  
 （血液をサラサラにする薬以外）を  
 再開する場合はお知らせします

10:00

検温、血圧測定  
 心電図モニターを外します  
 医師の許可があれば、看護師の見守りのもと水分をとってみましょう  
 尿の管を抜きます  
 トイレのときは看護師が付き添います

14:00

検温、血圧測定

看護師と一緒にベッドの横に立って  
 お部屋の中を歩く練習をします  
 看護師が体を拭きます

19:00

検温、血圧測定  
 洗面、歯磨きをしましょう

21:00

検温  
 血圧測定

- 性器出血の量が多いときは、看護師へお知らせください
- ガス、便が出たときは、時間、回数、量をお知らせください
- チューブ類は、引っ張らないように気をつけてください
- 最初にベッドから動くときは、看護師が付き添います

21:30


消灯

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

## 医療スタッフの目標

- 術後合併症の早期発見に努めます
- 床ずれの予防に努めます







## 今日の目標

- ・安静にしているときの痛みがない
- ・病棟内を歩くことができる
- ・排ガスがある

&lt;時間&gt;

&lt;予定&gt;

6:00

起床

本日から  
普通食です

7:00

検温、血圧測定

7:30

朝食

医師の指示で内服薬（血液をサラサラにする薬以外）を再開する場合はお知らせします

10:00

検温、血圧測定

病棟内を歩くことができます  
体を拭いてみましょう  
できるところは自分で  
拭いてみましょう

12:00

昼食

14:00

検温、血圧測定

18:00

夕食

19:00

検温  
血圧測定

- ・性器出血の量が多いときは、看護師へお知らせください
- ・ガス、便が出たときは、時間、回数、量をお知らせください
- ・チューブ類は、引っ張らないように気をつけてください

21:30

消灯

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

## 医療スタッフの目標

- ・術後合併症の早期発見に努めます
- ・床ずれの予防に努めます





## 今日の目標

- 安静にしているときの痛みがない
- 病棟内を歩くことができる
- 排ガスがある

&lt;時間&gt;

&lt;予定&gt;

6:00 起床

7:00 検温、血圧測定

7:30 朝食

9:00 背中の痛み止めの管を抜きます  
 お腹の管を抜きます  
 傷に貼ってあるテープをはがします

10:00 検温、血圧測定

12:00 昼食

14:00 検温、血圧測定

18:00 夕食  
 夕食後、下剤を服用します

19:00 検温、血圧測定

21:30 消灯

病棟内を歩くことができます  
 自分で体を拭いてみましょう  
 体の管がすべて抜けていれば、  
 シャワー浴ができます  
 (初回は看護師がお手伝いします)  
浴槽につかるのは、退院後の  
 初回外来まで禁止です

手術後の排便調節について説明します  
 「手術後の排尿・排便について」ページ参照

無理に腹圧をかけなくても2日に1回は  
 排便があるよう、服用を調節しましょう


- 性器出血の量が多いときは、看護師へお知らせください
- ガス、便が出たときは、時間、回数、量をお知らせください
- チューブ類は、引っ張らないように気をつけてください

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

## 医療スタッフの目標

- 術後合併症の早期発見に努めます
- 床ずれの予防に努めます





## 今日の目標

- 病棟内を歩くことができる
- シャワー浴ができる
- 1～2日に1度排便がある

&lt;時間&gt;

&lt;予定&gt;

6:00	起床
7:00	検温、血圧測定
7:30	朝食 朝食後、下剤を服用します
10:00	検温、血圧測定
12:00	昼食 昼食後、下剤を服用します
14:00	検温、血圧測定
18:00	夕食 夕食後、下剤を服用します
19:00	検温、血圧測定
21:30	消灯

病棟内を歩くことができます  
シャワー浴ができます  
(必要に応じて看護師がお手伝いします)  
浴槽につかるのは  
退院後の初回外来まで禁止です

無理に腹圧をかけなくても2日に1回は  
排便があるよう、下剤の服用を調節しましょう

• ガス、便が出たときは、時間、回数、量をお知らせください

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

## 医療スタッフの目標

- 術後合併症の早期発見に努めます





## 今日の目標

- 病院内を歩くことができる
- 1～2日に1度排便がある

&lt;時間&gt;

&lt;予定&gt;

6:00

起床

7:30

朝食

朝食後、下剤を服用します

10:00

検温、血圧測定

医師が傷を止めている金具を外します

12:00

昼食

昼食後、下剤を服用します

18:00

夕食

夕食後、下剤を服用します

21:30

消灯

病院内を歩くことができます  
シャワー浴ができます


無理に腹圧をかけなくても2日に1回は  
排便があるよう、下剤の服用を調節しましょう

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

## 医療スタッフの目標

- 術後合併症の異常の早期発見に努めます





## 今日の目標

- ・病院内を歩くことができる
- ・1～2日に1度排便がある

<時間>	<予定>
6:00	起床
7:30	朝食 朝食後、下剤を服用します
10:00	検温、血圧測定
12:00	昼食 昼食後、下剤を服用します
18:00	夕食 夕食後、下剤を服用します
21:30	消灯

病院内を歩くことができます  
シャワー浴ができます

無理に腹圧をかけなくても2日に1回は  
排便があるよう、下剤の服用を調節しましょう

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

- 医療スタッフの目標
- ・術後合併症の異常の早期発見に努めます





## 今日の目標

- 病院内を歩くことができる
- 1～2日に1度排便がある

<時間>	<予定>
6:00	起床
7:30	朝食 朝食後、下剤を服用します  血液検査、尿検査  医師が傷を止めている糸を抜きます
10:00	検温、血圧測定
12:00	昼食 昼食後、下剤を服用します
18:00	夕食 夕食後、下剤を服用します
21:30	消灯

病院内を歩くことができます  
シャワー浴ができます

無理に腹圧をかけなくても2日に1回は  
排便があるよう、下剤の服用を調節しましょう

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

## 医療スタッフの目標

- 術後合併症の異常の早期発見に努めます



手術後8日目～退院前日 月 日～ 月 日



今日の目標

- ・退院後の日常生活について理解できる
- ・1～2日に1度排便がある
- ・身のまわりのことができる

<時間>

<予定>

6:00

起床

7:30

朝食

朝食後、下剤を服用します

10:00

検温、血圧測定

12:00

昼食

昼食後、下剤を服用します

18:00

夕食

夕食後、下剤を服用します

21:30

消灯

病院内を歩くことができます  
シャワー浴ができます

医師の診察（内診、手術の説明、退院後の生活の説明）があります  
退院の許可が出れば、退院日を調整しましょう

【手術後8日目】  
看護師より退院後の日常生活について説明があります  
「退院後の日常生活について」ページ参照


無理に腹圧をかけなくても2日に1回は  
排便があるよう、下剤の服用を調節しましょう

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

医療スタッフの目標

- ・退院後の日常生活に不安が残らないよう支援します



退院日 月 日



### 今日の目標

- ・退院できる
- ・日常生活が自立できる

<時間>

<予定>

6:00

起床  
検温、血圧測定

7:30

朝食  
朝食後、下剤を服用します

「入院診療費料金連絡票」を病室にお届けします  
2階窓口でお支払終了後、病棟まで連絡票をお持ちください  
次回外来予約票をお渡しします

10:00

退院  
退院前に忘れ物がないようご確認ください

次回外来受診は

月 日 ( ) 時の予定です

気になること、  
心配なことがあれば  
遠慮なくお尋ねください




MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

医療スタッフの目標

- ・安心して退院できるよう支援します






## 手術後の体の変化

### 卵巣を摘出すると…

- 卵巣を摘出したところには腸が入り込むため、空洞にはなりません
- 片方の卵巣を摘出した場合は、残された卵巣が今までどおり二つ分の卵巣の働きをします  
女性ホルモンの分泌の変化はありません  
排卵もあります  
排卵期に起こっていた症状は同じように出ます
- 両方摘出した場合、ホルモンの分泌・排卵は起こりません  
そのため更年期症状が起こり易くなりますが、女性ホルモンにかわるホルモン分泌が副腎からも多少はありますので、必ずしも症状が出るとは限りません  
更年期症状の強いときは、ホルモン補充療法をすることもあります



# 手術後の排尿・排便について

## 排尿の変化について

手術の際に多少なりとも尿管や膀胱の壁を触っていますので、尿が出にくかったり、下腹部に不快を感じる事がありますが、これらの症状には個人差があります

尿意を我慢しすぎたり、水分をとる量が少ないときに膀胱炎になりやすい状態になっています

膀胱炎症状が現れたときは、水分を多くとってください  
それでも良くならないときは受診しましょう

### 膀胱炎について

膀胱炎症状（しみる、残尿感がある、尿がにごっている、尿が出にくい）など

## 排便調節について

手術前から便通を調節しておきましょう

1日に1回排便がない又は日頃から便秘気味な方は看護師に申し出てください  
手術後の創部の経過を良くする為に、手術の3日前から下剤の服用を開始します  
便通を円滑にするためにも、手術前から普段よりやや多めに水分をとるようにしてください

手術後は、腸の動きを良くするために、可能な範囲内で早めにベッド上で動くようにしてください

手術後食事が始まる頃から、下剤の服用を再開します

無理に腹圧をかけなくても、少なくとも2日に1回は排便があるように調節しましょう

下剤を服用しても排便のない場合は、看護師にお知らせください

排便の時間を決め、周期的にトイレに座る習慣をつけましょう

便が出にくいときは、無理に腹圧をかけず、看護師にご相談ください

無理に腹圧をかけると不正性器出血の原因になります

食事は、消化の良い物をお召し上がりください

また、よく噛んでから飲み込むようにしましょう



## 抜糸後のテーピング


抜糸後、創部にテープを貼ることでケロイド（傷が盛り上がり形成された状態）や、傷跡が幅広くなるのを防ぐ事ができます

テーピングは、2か月から数か月程度行います


テープの種類は〈マイクロポア〉〈アトファイン〉があります

### 【テープの貼り方 ※マイクロポアの場合】


① 3、4cmの長さに切ったテープを数本準備します



② 傷に対して垂直になるように貼っていきます



③ 傷の片側にテープを貼ります  
傷の片側から傷跡にむかって両方の皮膚を寄せるようにして貼ります



④ テープ下の部分が少し重なるように貼ります  
傷全体を覆うように貼って終了です



※テーピングの開始は、退院後初回外来以降となります

※外来診察時に、医師にテーピングをしたいことを伝えてください  
医師の許可が出れば開始できます




## 【テープのはがし方 ※マイクロポアの場合】

①重なっているテープの一番下からはがします




②傷と平行に引っ張ってはがしていきます



③はがすときは、もう一方の手で傷が引っ張られないように保護しながら はがします



④テープを全部はがし終わったら終了です  
傷を洗いましょう



テープは毎日貼り替えるのではなく3～4日毎に貼り替えましょう

はがれがなくしっかり貼れているのであれば、

1週間までそのままでもかまいません

入浴はテープを貼ったまま、行ってかまいません

貼り替える日に入浴される場合は、全部はがして入浴し、

皮膚をきれいにしてから貼りましょう

傷のまわりは優しく洗いましょう

皮膚がかぶれた場合は、テーピングを中止して医師に相談してください

傷の治りが悪い場合は、テーピングの開始が遅れることがあります



# 退院後の日常生活について

## ●活動

階段の昇降や重い荷物を持つなど、腹圧をかけるような活動は控えてください  
自動車を運転する場合は十分に気をつけ、徐々に慣らしていきましょう  
また、自転車・バイクの使用は次回外来受診日まで控えましょう  
それまでは、できるだけ公共の交通機関などを利用するようにしてください  
また、社会復帰（特に重労働：荷物運びや長時間の立ち仕事、長期の旅行、スポーツ）については、医師と相談してください

退院後1週間まで：家の中で過ごすことを中心にしましょう

炊事、洗濯等の家事はかまいませんが、長時間立つことは避けましょう

約2時間に1度は休みながら、疲れないように行うようにしましょう

1週目以降：家の中の家事に慣れたら買い物等で外に出るようにしましょう

（人ごみは避けましょう）

2週間目以降：お腹に負担のかかる家事は控えましょう

（重い荷物を持つ、運ぶ、布団の上げ下ろし等）

## ●清潔

浴槽に入らないでシャワーだけにしましょう

冬は浴室を湯気で温めてシャワーするといいいでしょう

石けんは使用してもかまいませんが、傷口や外陰部は強く

こすらないようにしましょう

傷口のかさぶたは無理にとらないようにしてください

次回外来受診日に入浴（浴槽に入る）許可をもらってください



ウォシュレットは使用しても結構です

## ●食事

特に制限はありませんが、過食、間食に注意して  
栄養バランスの良い食事をするようにしましょう



## ●性生活について

がんの治療を受けた後は、性生活にさまざまな変化が見られることがあります  
退院後、パートナーとの関係に不安を持つ方も少なくありません

自分自身の気持ちをパートナーに伝えたり、手術前のパターンにこだわらず話し合ったりすることも大切です

コミュニケーションやスキンシップをとりながら、お互いに満足できる方法を見つけていきましょう

まずは手を繋ぐ、優しく抱きしめる、背中や手足のマッサージをするなど相手に触れ、ぬくもりを感じることから始めてみましょう

## ★性生活についてのQ&A★

Q1 いつから性行為しても大丈夫ですか？

A：退院後、初回の外来受診以降で主治医の許可があれば大丈夫です  
目安は2～6か月後です

Q2 性交時に痛みがあったり、膣分泌物が減ったりしますか？

A：個人差があります

卵巣をとることで女性ホルモンが減少し膣の潤いが低下することがあります  
分泌物が少ないときや性交時に痛みがあるときは、膣潤滑ゼリーのご使用をお勧めします

患者・家族総合支援センター“暖だん”にゼリーを置いてありますので、お気軽にご覧ください

Q3 性行為は手術前と同じようにしてもよいですか？

A：手術で膣の一部を切除していることがあります

傷口が硬くなっていることもあるので激しい動きは避け、ゆっくり行いましょう  
傷が治癒していれば、出血したり傷が破れたりする事はありませんので安心してください



## ●仕事

これから先、安心して働き続けるためには、体の状態に合わせた休み方や働き方が必要になることもあります

病院では、患者さんの「働きたい！」をサポートしています  
私たちと一緒に考えていきましょう



### 【相談窓口】

がん相談支援センター相談員

・医療ソーシャルワーカー、看護師

<出張相談>

・ハローワーク松山就職支援ナビゲーター

・両立支援促進員（社会保険労務士）

ご相談は、がん相談支援センターへお問い合わせください

## ●退院後の受診

退院後の定期受診は必ず受けてください

この検診は、今後の生活を進めていくうえで大切なものです

主治医から外来受診日を確認しておきましょう

- ・次回外来受診日は大体2週間後で、それ以降は3～6か月毎になっています

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう



- 更年期症状が強いとき（のぼせ、ほてり、動悸、息切れなど）
- 体がだるいとき
- 貧血の症状があるとき（顔色が悪い、疲れやすい、めまい、動悸）
- 性出血があるとき
- おりものに悪臭や痒みがあるとき
- 頑固な便秘のとき  
（お腹が張る・痛む、ガスや便が一度にすっきり出ない）
- 高熱が出るとき（38.0℃以上）
- 膀胱炎症状が続くとき  
（しみる、残尿感がある、尿がにごっている、尿が出にくい）

上記のような症状がある場合やその他ご心配なことがある場合は、  
がん相談支援センターにご連絡ください

◆四国がんセンターの連絡先◆

【平日】 8：30～17：15  
四国がんセンター がん相談支援センター  
（直通番号） 089-999-1114

【平日上記時間外および土・日・祝日】  
日直/夜間当直師長  
（代表番号） 089-999-1111

\* 外来受診日や検査予約日の変更については、  
予約センターにご連絡ください

【平日】 8：30～17：15  
（直通番号） 089-999-1112



開腹付属器腫瘍摘出術を受けられる方へ